



Riva Light Cure Capsules 2-hydroksietyylimetakrylaatti, KARBOMEERI, dimethacrylate cross-linker, acidic monomer, (+)-viinihappo, glass powder		31.8.2016		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Lasi-ionomeerin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
SDR flow + Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a,a'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[w-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl) oxy] 2,2´-ethylenedioxydiethyl dimetharcylate		13.3.2024		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
Tetric EvoFlow uretaanidimetakrylaatti 1,10-dekandioldimetakrylaatti		9.10.2023		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
TheraCal LC Portlandsementti, Tetraetyleeniglykolidimetakrylaatti, Bariumzirkonaatti		28.2.2012		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, CaOH:n vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
Coltosol F Sinkkioksid, sinkkisulfaatti (mono-, hexa- ja heptahydraatti), piparminttu aromi, Natriumfluoridi		13.5.2019		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
IRM Liquid Eugenoli				Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, täytteen vieminen hampaalle. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
DENTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrog/ml injektioneste, liuos Vaikuttavat aineet: adrenaliinitartraatti 5 mikrog/ml | artikaiinihydrokloridi 40 mg/ml			pH-arvo on välillä 3.0 - 5.0. Liuoksen osmolaliteetti on noin 290 mOsm/kg.	Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ampullista injisoiminen subcutanisesti.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN 30 mg/ml+0,54 mikrog/ml injektioneste, liuos			Prilokaiinin pKa on 7,9 ja N-heptaani/pH 7,4 puskurijakokerroin 0,9. Prilokaiini sitoutuu 40-55 %:sesti plasman proteiineihin, pääasiassa happamaan alfa1glykoproteiiniin. Prilokaiini jakautuu verestä edelleen nopeasti ja sen jakautumistilavuus on 190-260 litraa. Prilokaiinin eliminaation puoliintumisaika on 1,6 tuntia.	Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ampullista injisoiminen subcutanisesti.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
BETADINE 100 mg/ml paikallisantiseptiliuos Vaikuttavat aineet: povidoni (jodattu) 100 mg/ml			Povidonijodia ei saa käyttää samanaikaisesti samalle ihoalueelle emäksen, vetyperoksidin, taurolidiniinin, tanniinihapon ja hopea- ja elohopeasuolojen kanssa	Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.					