MEDNIEMI

Suun terveydenhuollon työskentely- ja toimintaohje

1. ESIHAASTATTELU

- Oire- ja altisteperusteinen potilaiden esihaastattelu on keskeinen tapa hallita tartuntariskejä suun terveydenhuollossa
    - **Esihaastattelun merkitys tartuntariskien hallinnassa on edelleen erittäin tärkeää. Tartunnat ovat mahdollisia myös rokotetuilla. Myös hyvin lievät koronavirusinfektioon sopivat oireet voivat olla merkki infektiosta.**
    - Koronavirusinfektio on akuutti hengitystieinfektio, jonka oireena voi olla kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju-/makuaistin menetys (yksi oire riittää) tai ripuli/ pahoinvointi ilman muuta ilmeistä syytä.
    - Ajanvarausvastaanoton kutsukirjeeseen lisätään muistutus siitä, että käynti tulee peruuttaa, jos on koronavirusinfektion oireita, määrätty infektion vuoksi eristykseen tai altistumisen vuoksi karanteeniin tai suositeltu vapaaehtoista kontaktien välttämistä. Näistä tiedustellaan myös päivystyshoidon yhteydenotoissa sekä aina potilaan hoitoyksikköön saapuessa.
    - Mikäli potilaalla on hoitoon tullessa koronainfektioon sopivia oireita tai lämpöä, hänelle annetaan kirurginen suu-nenäsuojain ja hänet ohjeistetaan palaamaan kotiin ja tekemään koronakotitesti tai hakeutumaan tarvittaessa testiin laboratorioon.

2. HOITOPAIKAN JA HOIDON AJANKOHDAN MÄÄRÄYTYMINEN

2.1. Oireinen, eristyksessä oleva tai koronavirukselle altistunut

Hoidon järjestelyt, kun

1) potilaalla on koronavirusinfektioon sopivia oireita
    - Ohjaa potilas tekemään koronakotitesti tai hakeutumaan tarvittaessa testiin laboratorioon. Negatiivinen koronakotitestin tulos pitää varmistaa laboratoriotestillä.
    - Jos laboratoriossa tehdyn koronatestin tulos on negatiivinen, kiireetön hammashoito siirretään, kunnes potilas on ollut oireeton vähintään 2 vrk.
    - Jos testitulos on positiivinen, katso seuraava kohta.
2) potilaalla on todettu koronavirusinfektio
    - Kiireetöntä hammashoitoa siirretään, kunnes oireiden alusta tai oireettomalla testipäivästä on kulunut vähintään 5 vrk ja potilas on ollut oireeton vähintään 2 vrk. Tämän jälkeen hoito voidaan toteuttaa tavanomaisesti epidemian ajankohtaisia hoito-ohjeita noudattaen.