- Kirurgista suu-nenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta käytetään kaikissa potilaskontakteissa sekä niissä tiloissa, joissa liikkuu potilaita (esimerkiksi aulatilat).
- Suojainta ei tarvitse käyttää kansliatiloissa tai työ- ja kokoushuoneissa, joissa on vain henkilökuntaa. Suojaimen käyttö kannattaa kuitenkin edelleen, jos tilassa on paljon ihmisiä tai työskennellään lähekkäin. Maskia kannattaa käyttää myös ulkomaanmatkojen ja isojen juhlien/kokoontumisten jälkeen 5 vuorokauden ajan.
- Koronavirukselle altistunut työntekijä käyttää kaikissa tilanteissa kirurgista suu-nenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta 10 vrk ajan altistustilanteen jälkeen. Ruokailu tapahtuu 2 m turvaväli pitäen ja alle 15 min kestävänä tai yksin. Jos työntekijä on sairastanut itse koronavirusinfektion 1 kk sisällä, häntä ei katsota altistuneeksi.
- Koronaviruksen sairastanut työntekijä käyttää kaikissa tilanteissa kirurgista suu-nenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta 10 vrk ajan oireiden alusta, jos hän palaa töihin ennen kuin oireiden alusta on kulunut 10 vrk. Ruokailu tapahtuu 2 m turvaväli pitäen ja alle 15 min kestävänä tai yksin.

- **Työntekijä, jonka rokotussuoja on riittämätön**, käyttää edelleen sekä potilaskontakteissa että tiloissa, joissa liikkuu potilaita tai on muita työntekijöitä FFP2/3-hengityksensuojainta.

4. TOIMINTA POTILAAN HOIDOSSA

Potilastyössä noudatetaan tavanomaisia varotoimia, kts tarkemmin Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan.

4.1. Suojaimet

- Luokan II kirurginen suunenäsuojain ja visiiri tai luokan IIR kirurginen suu-nenäsuojain ja suojalasit tai visiiri, näistä kahdesta luokan IIR kirurginen suu-nenäsuojain on ensisijaisesti suositeltava. Oman harkinnan mukaan voi kirurgisen suu-nenäsuojaimen sijasta käyttää venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta.
- Nitriili- tai luonnonkumisuojakäsineet
- Hiussuojain

  - Suojaimet puetaan ja riisutaan hyviä aseptisia käytäntöjä noudattaen. Puettujen suojaimien koskettelua vältetään. Kädet desinfioidaan aina, jos on koskenut käytössä olleeseen suojaimeen.
  - Kädet desinfioidaan aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.
  - Kirurginen suu-nenäsuojain/FFP2-suojain ja visiiri puetaan ennen potilaan saapumista hoitohuoneeseen ja riisutaan vasta potilaan huoneesta poistumisen jälkeen.